

# Exercices : Anneaux

D. Harari

Agrégation

1. Soit  $A$  un anneau commutatif. On pose  $R = A[X]$ .
  - a) Montrer que si  $A$  est intègre, le groupe  $R^*$  des inversibles de  $R$  est constitué des polynômes constants de  $A^*$ .
  - b) Donner un exemple d'anneau commutatif  $A$  contenant un élément  $\varepsilon \neq 0$  avec  $\varepsilon^2 = 0$ .
  - c) Montrer que le résultat de a) ne vaut plus pour un tel anneau.
  
2. Soient  $A$  et  $B$  des anneaux commutatifs. Soit  $R = A[X_1, \dots, X_n]$ . Montrer que pour tout morphisme d'anneaux  $\varphi : A \rightarrow B$  et pour toute famille  $b_1, \dots, b_n$  d'éléments de  $B$ , il existe un unique morphisme d'anneaux  $f : R \rightarrow B$  vérifiant :  $f(a) = \varphi(a)$  pour tout polynôme constant  $a \in A$ , et  $f(X_i) = b_i$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$  ("propriété universelle des anneaux de polynômes").
  
3. a) Montrer que l'image réciproque d'un idéal premier par un morphisme d'anneaux reste un idéal premier.
  - b) Un idéal  $I$  d'un anneau commutatif  $A$  est dit *maximal* si  $I \neq A$  et tout idéal de  $A$  contenant strictement  $I$  est égal à  $A$ . Montrer que  $I$  est maximal si et seulement si l'anneau quotient  $A/I$  est un corps.
  - c) L'image réciproque d'un idéal maximal par un morphisme d'anneaux est-elle toujours un idéal maximal ?
  - d) En utilisant le lemme de Zorn, montrer que tout idéal  $I$  d'un anneau commutatif  $A$ , avec  $I \neq A$ , est contenu dans un idéal maximal. En particulier tout anneau non nul possède au moins un idéal maximal.
  - e) Montrer que dans un anneau principal, tout idéal premier non nul est maximal.
  
4. (Suite de l'exercice 3, dont on pourra utiliser les résultats) Un anneau commutatif  $A$  est dit *local* s'il est non nul et possède un unique idéal maximal.

a) Montrer que  $A$  est local si et seulement si l'ensemble  $A - A^*$  de ses éléments non inversibles est un idéal de  $A$ .

b) Montrer que dans ce cas  $A - A^*$  est l'unique idéal maximal de  $A$ .

c) Montrer que l'anneau  $\mathbf{C}[[X]]$  des séries formelles à coefficients complexes est un anneau local. Quel est son idéal maximal ?

**5.** Soit  $A$  un anneau commutatif noethérien. Le but de cet exercice est de montrer que l'anneau  $A[X]$  est noethérien. Pour tout idéal  $I$  de  $A[X]$  et tout  $n \in \mathbf{N}$ , on note  $d_n(I)$  le sous-ensemble de  $A$  constitué de 0 et des coefficients dominants des polynômes de degré  $n$  de  $I$ .

a) Montrer que  $d_n(I)$  est un idéal de  $A$ . Si  $I$  et  $J$  sont des idéaux de  $A[X]$ , montrer que  $I \subset J$  implique  $d_n(I) \subset d_n(J)$ .

b) Montrer que si  $n \in \mathbf{N}$ , alors  $d_n(I) \subset d_{n+1}(I)$ .

c) Montrer que si  $I \subset J$  et  $d_n(I) = d_n(J)$  pour tout  $n \in \mathbf{N}$ , alors  $I = J$ .

On considère maintenant une suite croissante  $(I_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$  d'idéaux de  $A[X]$ . On note  $d_i(I_m)$  un élément maximal de la famille des  $d_k(I_n)$  ( $k \in \mathbf{N}$ ,  $n \in \mathbf{N}^*$ ), qui existe puisque  $A$  est noethérien.

d) Montrer que pour tout  $k \leq l$ , il existe un entier  $n_k$  tel que pour tout  $n \geq n_k$ , on ait  $d_k(I_n) = d_k(I_{n_k})$ .

Dans la suite, on pose  $N = \max(m, n_0, n_1, \dots, n_l)$ .

e) Montrer que pour tout  $n \geq N$  et tout  $k \in \mathbf{N}$ , on a  $d_k(I_n) = d_k(I_N)$  (on distinguera les cas  $k \leq l$  et  $k > l$ ).

f) Conclure que  $A[X]$  est noethérien. Que dire de  $A[X_1, \dots, X_r]$  si  $r \in \mathbf{N}^*$  ?

g) Soit  $A$  un anneau noethérien. Soit  $B$  un anneau tel qu'il existe  $b_1, \dots, b_r \in B$  et un morphisme d'anneau  $\varphi : A \rightarrow B$  vérifiant : le sous-anneau de  $B$  engendré par  $\varphi(A)$  et les  $b_i$  est  $B$ . Montrer que  $B$  est noethérien (un tel  $B$  s'appelle une  $A$ -algèbre de type fini).